Quadro 1: Estudos que acompanharam gestantes suscetíveis, vacinadas contra rubéola, e avaliação dos seus recém-nascidos

País	Nº de Gestantes	RN com	RN com
	Suscetíveis	IgM+	SRC
EUA	272	2	-
Reino Unido	61	1	-
Alemanha	119	2	-
Canadá	94	-	-
Total	546	5	-

- ? durante a Campanha de Vacinação foram vacinadas 4.800.000 mulheres (98%), entre 15 a 29 anos de idade.
- ? risco teórico para ocorrência de malformações congênitas pós-vacina contra a rubéola, varia de zero a 1,3%.
- ? risco real: zero.
- ? reafirmar a segurança da vacina contra a rubéola quando aplicadas em mulheres grávidas.




ESTADO DE SÃO PAULO

CAMPANHA DE VACINAÇÃO CONTRA RUBÉOLA PARA MULHERES DE 15 A 29 ANOS - NOVEMBRO/2001

Fluxograma de acompanhamento

Gestantes vacinadas e mulheres que engravidaram até 30 dias apósa vacina Vacinada anteriormente Não vacinada anteriormente com cartão de vacina ou sem cartão Colher sorologia Não acompanhar ?**70**d após a >70d após a vacinação vacinação IgM - e IgG IgM + e IgG -IgM - e IgG + **ACOMPANHAR** < 30d colher 30-60d nova sorol. revacinar no em 15d pós- parto < 30d não ?30-70d IgM - e IgG -IgM - e IgG + acompanhar teste de avidez revacinar no Indeterminado (imune) (acompanhar RN) pós-parto Elevada não Baixa acompanhar **ACOMPANHAR** (imune)

Gráfico1:GESTANTES VACINADAS SEGUNDO CLASSIFICAÇÃO



N= 6163 CASOS

Tabela 1: GESTANTES VACINADAS NOTIFICADAS POR DIR

DIR	NOTIF	%
1	1138	18,5
2	359	5,8
3	295	4,8
4	26	0,4
5	308	5,0
6	190	3,1
7	191	3,1
8	129	2,1
9	129	2,1
10	118	1,9
11	123	2,0
12	563	9,1
13	101	1,6
14	231	3,7
15	218	3,5
16	215	3,5
17	67	1,1
18	398	6,5
19	205	3,3
20	242	3,9
21	176	2,9
22	186	3,0
23	428	6,9
24	127	2,1
TOTAL	6163	100,0

Gráfico 2: GESTANTES VACINADAS : CASOS POR DIR DE RESIDÊNCIA




Gráfico 3: GESTANTES VACINADAS : CASOS POR MÊS/ANO PROVÁVEL DO PARTO





Gráfico 4: GESTANTES VACINADAS : COEF. DE NOTIFICAÇÃO POR 1000 DOSES APLICADAS DA VACINA SEGUNDO A DIR




FONTE : BANCO RUBGEST/D.IMUNIZAÇÃO/CVE

DADOS EM 07/10/02

Tabela 2: GESTANTES VACINADAS : SUSCETÍVEIS POR DIR

DIR	CASOS	%
1	211	28,2
2	64	8,6
3	36	4,8
4	9	1,2
5	60	8,0
6	10	1,3
7	20	2,7
8	6	0,8
9	9	1,2
10	18	2,4
11	9	1,2
12	62	8,3
13	7	0,9
14	26	3,5
15	18	2,4
16	21	2,8
17	9	1,2
18	29	3,9
19	13	1,7
20	25	3,3
21	19	2,5
22	12	1,6
23	43	5,7
24	12	1,6
TOTAL	748	100,0

Gráfico 5: GESTANTES VACINADAS : PROPORÇÃO DE SOROLOGIAS DE RN ENCAMINHADAS AO IAL.



RN IgM+

- 18 RN de mães do grupo A (suscetíveis).
 - 5 DIR-1, 3 DIR-2, 2 DIR-5, 2 DIR-7, 1 DIR-9, 1 DIR-10, 2 DIR-12,
 - 2 DIR-14.
- 5 RN de mães fora do banco (não notificadas).
 - 1 DIR-1, 2 DIR-2, 1 DIR-4, 1 DIR-24.
- 2 grupo C (mãe IgG+ com coleta > 70 dias).
 - 1 DIR-1, 1 DIR-18,
- Acompanhamento:
 - Instituto da Criança/HCFMUSP
 - UNICAMP
 - Faculdade de Medicina de Marília
 - Faculdade de Medicina de Ribeirão Preto
 - Faculdade de Medicina de Taubaté

Acompanhamento do RN IgM+ ou com IgG aumentado

- Exame físico
- RX de ossos longos
- Avaliação da cardiologia
- Avaliação do oftalmologia
- Avaliação auditiva (Emissão de ondas otoacústicas, BERA)
- Avaliação da neurologia
- Avaliação da genética