



# Calendário de vacinação para o estado de São Paulo 2016

Idade	Vacina
<b>A partir do nascimento</b>	BCG <sup>1</sup> , Hepatite B <sup>2</sup>
<b>2 meses</b>	VIP <sup>3</sup> , Pentavalente (DTP+Hib+HB), Rotavírus <sup>4</sup> , Pneumocócica 10 valente
<b>3 meses</b>	Meningocócica C
<b>4 meses</b>	VIP <sup>3</sup> , Pentavalente (DTP+Hib+HB), Rotavírus <sup>5</sup> , Pneumocócica 10 valente
<b>5 meses</b>	Meningocócica C
<b>6 meses</b>	VIP <sup>3</sup> , Pentavalente (DTP+Hib+HB)
<b>9 meses</b>	Febre Amarela <sup>6</sup>
<b>12 meses</b>	Sarampo-Caxumba-Rubéola (SCR), Meningocócica C, Pneumocócica 10 valente
<b>15 meses</b>	VOP <sup>7</sup> , DTP <sup>8</sup> , Hepatite A, Tetraviral (SCR+Varicela) <sup>9</sup>
<b>4 anos</b>	VOP <sup>7</sup> , DTP <sup>8</sup> , Febre Amarela <sup>6</sup>
<b>Anualmente</b>	Influenza <sup>10</sup>



# Calendário de vacinação para o estado de São Paulo

## 2016

### Notas

- 1 - Caso a vacina BCG não tenha sido administrada na maternidade, aplicar na primeira visita ao serviço de saúde.
- 2 - A vacina hepatite B deve ser administrada preferencialmente nas primeiras 12 horas de vida, ainda na maternidade. Caso não tenha sido administrada na maternidade, aplicar na primeira visita ao serviço de saúde. Se a primeira visita ocorrer após a 6ª semana de vida, administrar a vacina pentavalente (DTP-Hib-HB).
- 3 – Vacina inativada poliomielite.
- 4 - A 1ª dose da vacina rotavírus deve ser aplicada aos 2 meses de idade. A idade mínima para administração desta dose é de 1 mês e 15 dias e a idade máxima é de três meses e 15 dias.
- 5 - A 2ª dose da vacina rotavírus deve ser aplicada aos 4 meses de idade. A idade mínima para administração desta dose é de 3 meses e 15 dias e a idade máxima é de 7 meses e 29 dias.
- 6 - Para aqueles que residem ou viajam para regiões onde houver indicação, de acordo com a situação epidemiológica.
- 7 – Vacina oral poliomielite.
- 8 - A vacina DTP(difteria,tétano e coqueluche) só pode ser administrada em crianças até 6 anos, 11 meses e 29 dias. A partir dos 7 anos de idade, utilizar a vacina dupla adulto.
- 9 - A vacina tetraviral deverá ser administrada em crianças que já receberam uma dose de Sarampo-caxumba-rubéola.
- 10- - Disponível na rede pública durante os períodos de campanha.

BCG – Vacina BCG (contra tuberculose)

VIP – Vacina poliomielite 1,2 e 3 (inativada)

VOP – Vacina poliomielite 1,2 e 3 (atenuada)

DTP – vacina adsorvida difteria, tétano e pertussis (tríplice bacteriana)



# Esquema de vacinação para crianças (com sete anos ou mais) e adolescentes<sup>1</sup> 2016

INTERVALO ENTRE AS DOSES	VACINA	ESQUEMA
<b>PRIMEIRA VISITA</b>	BCG <sup>2</sup> HEPATITE B dT - DUPLA TIPO ADULTO <sup>3</sup> VIP HPV <sup>4</sup> SARAMPO, CAXUMBA, RUBÉOLA - SCR	DOSE ÚNICA PRIMEIRA DOSE PRIMEIRA DOSE PRIMEIRA DOSE PRIMEIRA DOSE PRIMEIRA DOSE
<b>2 MESES APÓS A PRIMEIRA VISITA</b>	HEPATITE B <sup>5</sup> dT - DUPLA TIPO ADULTO <sup>3</sup> VIP SARAMPO, CAXUMBA, RUBÉOLA - SCR	SEGUNDA DOSE SEGUNDA DOSE SEGUNDA DOSE SEGUNDA DOSE
<b>4-6 MESES APÓS A PRIMEIRA VISITA</b>	HPV <sup>6</sup> HEPATITE B <sup>7</sup> dT - DUPLA TIPO ADULTO <sup>3</sup> VIP FEBRE AMARELA <sup>8</sup>	SEGUNDA DOSE TERCEIRA DOSE TERCEIRA DOSE TERCEIRA DOSE DOSE INICIAL
<b>A CADA 10 ANOS POR TODA A VIDA</b>	dT - DUPLA TIPO ADULTO <sup>9</sup>	REFORÇO
<b>REFORÇO ÚNICO APÓS 10 ANOS</b>	FEBRE AMARELA <sup>8</sup>	REFORÇO



# Calendário – Crianças com sete anos ou mais e adolescentes<sup>1</sup>

2016

## Notas

- 1- Adolescência - período entre 10 e 19 anos de idade. Caso a pessoa apresente documentação com esquema de vacinação incompleto, completar o esquema iniciado.
- 2 - A vacina BCG é indicada para pessoas até 15 anos de idade.
- 3 - Caso o adolescente tenha recebido três ou mais doses das vacinas DTP, DT e dT, aplicar uma dose de reforço, se decorridos 10 anos da última dose.
- 4 - Vacina papilomavirus humano para meninas de 9 anos até 13 anos de idade.
- 5 - O intervalo mínimo entre a primeira e a segunda dose da vacina hepatite B é de 4 semanas.
- 6 - O intervalo mínimo entre a primeira e a segunda dose da vacina papilomavirus humano é de 6 meses.
- 7 - O intervalo para a terceira dose da vacina hepatite B pode ser de dois meses após a segunda, desde que o intervalo de tempo decorrido da primeira dose seja, no mínimo, de quatro meses.
- 8 - Para aqueles que residem ou viajam para regiões onde houver indicação, de acordo com a situação epidemiológica.
- 9 - Na profilaxia do tétano após alguns tipo de ferimentos, deve-se reduzir este intervalo para 5 anos.

BCG – Vacina BCG (contra tuberculose)

dT – Vacina adsorvida difteria e tétano adulto (dupla tipo adulto)

VIP – Vacina poliomielite 1,2 e 3 (inativada)

HPV – Vacina papilomavirus humano 6, 11, 16 e 18 (recombinante)