



IDADE	VACINA
Ao nascer	BCG, HEPATITE B
2 meses	POLIOMIELITE, HEPATITE B ¹ , TETRAVALENTE (DTP + Hib) ROTAVIRUS HUMANO ²
4 meses	POLIOMIELITE, TETRAVALENTE (DTP + Hib) ROTAVIRUS HUMANO ³
6 meses	POLIOMIELITE, HEPATITE B ⁴ , TETRAVALENTE (DTP + Hib)
9 meses	FEBRE AMARELA ⁵
12 meses	SARAMPO, CAXUMBA, RUBÉOLA (SCR)
15 meses	DTP, POLIOMIELITE
4 a 6 anos	DTP, POLIOMIELITE SCR
15 anos ⁶	dT

BCG: vacina contra tuberculose

DTP: vacina contra a difteria, a coqueluche e o tétano

dT: vacina dupla, tipo adulto, contra a difteria e o tétano

SCR: vacina contra o sarampo, caxumba e rubéola

1 - O intervalo mínimo entre a primeira e a segunda dose da vacina contra a hepatite B é de 30 (trinta) dias.

2 - Idade máxima para primeira dose é de 3 meses e 7 dias

3 - Idade máxima para segunda dose é de 5 meses e 15 dias

4 - O intervalo entre a segunda e a terceira dose é de dois meses, desde que o intervalo de tempo decorrido entre a primeira e a terceira dose, seja no mínimo, de quatro meses e a criança já tenha completado 6 meses de idade.

5 - Nas regiões onde houver indicação, de acordo com a situação epidemiológica. Reforço a cada dez anos.

6 - Reforço a cada dez anos por toda a vida. Em caso de gravidez e na profilaxia do tétano após alguns tipos de ferimentos, deve-se reduzir este intervalo para cinco anos.