

FOSCAVIR

Infecção oportunista relacionada à síndrome da imunodeficiência adquirida (AIDS)

Informações gerais

Apresentação: 24 mg/mL – solução injetável.

CID-10: B202, B203

Esquema terapêutico recomendado:

- tratamento de infecção por citomegalovírus, na impossibilidade de uso do ganciclovir:
90 mg/kg/dose, via endovenosa, de 12 em 12 horas OU 60 mg/kg/dose, via endovenosa, de 8 em 8 horas por 14 a 21 dias.
- profilaxia secundária de citomegalovirose, na impossibilidade de uso do ganciclovir:
90 mg/kg/dose, via endovenosa, uma vez ao dia.
- tratamento de herpes simples ou herpes zoster, em caso de suspeita de resistência viral ao aciclovir:
40 mg/kg/dose, via endovenosa, de 8 em 8 horas, por até 26 dias.

Responsável pelo financiamento: Secretaria de Estado da Saúde

Observações:

Conservar em temperatura ambiente (entre 15°C e 30°C), protegido da luz e umidade.

Medicamento de uso hospitalar.

Mais informações: [Deliberação CIB 25, de 16/06/2011](#)

Solicitação do Medicamento

O paciente ou seu representante deve entrar em contato com uma das [Unidades Dispensadoras de Medicamentos \(UDM\)](#) para informações da documentação e processos exigidos para a retirada dos medicamentos.

